校正外臺祕要方序

夫外臺者刺史之任也祕要者祕密樞要之謂也唐王燾臺閣二十餘載久知洪文館得古今方上自神農下及唐世無不採摭集成經方四十卷皆諸方祕密樞要也以出守于外故號曰外臺祕要方凡一千一百四門以巢氏病源諸家論辨各冠其篇首一家之學不爲不詳王氏爲儒者醫道雖未及孫思邈然而採取諸家之方頗得其要者亦崔氏孟詵之流也且古之如張仲景集驗小品方最爲名家今多亡逸雖載諸方中亦不能别白王氏編次各題名號使後之學者皆知所出此其所長也又謂鍼能殺生人不能起死人其法亡之且久故取灸而不取鍼亦醫家之蔽也此方撰集之時或得缺落之書因其闕文義理不完者多矣又自唐歷五代傳寫其本訛舛尤甚雖鴻都祕府亦無善本

國家詔儒臣校正醫書臣承
命以其書方證之重者刪去以從其簡經書之異者注解以著其詳魯魚豕亥煥然明白臣謂三代而下文物之盛者必曰西漢止以侍醫李柱國校方技亦未嘗命儒臣也臣雖濫吹儒學但盡所聞見以脩正之有所闕疑以待來哲揔四十卷并目錄一卷恭惟
主上盛德承統
深仁流化
頒此方論
惠及區宇
賛天地之生育
正萬物之性命使歲無疵癘人不夭橫熙熙然歌樂於
聖造者也前將仕郎守殿中丞同校正醫書臣孫兆謹上

國立故宮博物院 NATIONAL PALACE MUSEUM

外臺秘要方序

唐銀青光祿大夫使持節鄴郡諸軍事兼守刺史上柱國清源縣開國伯王　燾　撰

昔者農皇之治天下也嘗百藥立九候以正陰陽之變沴以救性命之昏札俾厥土宇用能康寧廣矣哉洎周之王亦有冢卿格于醫道掌其政令聚毒藥以供其事焉歲終稽考而制其食十全爲上失四下之我國家率由茲典動取厥中置醫學頒良方亦所以極元氣之和也夫聖人之德又何以加於此乎故三代常道百王不易又所從來者遠矣自雷岐倉緩之作彭扁華張之起迨茲厥後仁賢間出歲且數千方逾萬卷專車之不受廣廈之不容然而載祀綿遠簡編虧替所詳者雖廣所略者或深討檢則功倍力煩取捨則論甘忌苦永言筆削未暇尸之余幼多疾病長好醫術遭逢有道遂躡亭衢七登南宮兩拜東掖便繁臺閣二十餘載久知弘文館圖籍方書等繇是覩奥升堂

皆探其秘要以婚姻之故貶守房陵量移大寧郡提携江上冒犯蒸暑自南徂北既僻且陋染瘴嬰痾十有六七死生契闊不可問天賴有經方僅得存者神功妙用固難稱述遂發憤刊削庶幾一隅凡古方纂得五六十家新撰者向數千百卷皆研其總領覈其指歸近代釋僧深崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇等十數家皆有編録竝行於代美則美矣而未盡善何者各擅風流遞相矛楯或篇目重雜或商較繁蕪今竝味精英鈐其要妙俾夜作晝經之營之捐衆賢之砂礫掇羣才之翠羽皆出入再三伏念旬歲上自炎昊迄于聖唐括囊遺闕稽考隱秘不愧盡心焉客有見余此方曰嘻博哉學乃至於此邪余荅之曰吾所好者壽也豈進於學哉至於遁天倍情懸解先覺吾常聞之矣投藥治疾庶幾有瘳乎又謂余曰稟生受形咸有定分藥石其如命何吾甚非之請論其目夫喜怒不節飢飽

失常嗜慾攻中寒温傷外如此之患豈由天乎夫爲人臣爲人子自家刑國由近兼遠何談之容易哉則聖人不合啓金縢賢者曷爲條玉版斯言之玷竊爲吾子羞之客曰唯唯嗚呼齊梁之間不明醫術者不得爲孝子曾閔之行宜其用心若不能精究病源深探方論雖百醫守疾衆藥聚門適足多疑而不能一愈之也主上尊賢重道養壽祈年故張王李等數先生繼入皆欽風請益貴而遵之故鴻寶金匱青囊緑帙往往而有則知日月所照者遠聖人所感者深至於嗇神養和沐老補病者可得聞見也余敢採而録之則古所未有今竝繕緝而能事畢矣若乃分天地至數别陰陽至候氣有餘則和其經渠以安之志不足則補其復溜以養之溶溶波波調上調下吾聞其語矣未遇其人也不誣方將請俟來哲其方凡四十卷名曰外臺秘要方非敢傳之都邑且欲施於後賢如或詢謀亦所不隱是歲天

寶十一載歲在執徐月之哉生明者也

外臺秘要方卷第一 傷寒上一十二門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

諸論傷寒八家合一十六首
論傷寒日數病源并方二十一首
肘後方七首
深師方四首
小品方四首
集驗方五首
千金方六首
千金翼方一十三首
崔氏方一十五首 附一方
張文仲方一十首
古今錄驗方八首

雜療傷寒湯散丸方八首（並是論中所要）

諸論傷寒八家合一十六首

陰陽大論云春氣温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺癘之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚中至春變為温病至夏變為暑病暑病者熱極重於温也是以辛苦之人春夏多温熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也（仲景病源小品千金同）

王叔和曰傷寒之病逐日淺深以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫又不知次第而治之則不中病皆以臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論録其證候診詠聲色對病眞方有神驗者擬防世急也又土地高下寒温不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜須兩審也（小品千金同）

又曰夫表和裏病（一作陽盛陰虛）下之而愈汗之則死裏和表病（一作陽虛陰盛）汗之而愈下之則死夫如是則神丹不可以誤發（神丹丸在此卷崔氏部中六味者是也）甘遂何可以妄攻（甘遂者水導散也在第三卷天行狂語部中甘遂等二味者是也出千金方）表裏之治相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽表和則斃（桂枝湯在此卷仲景日數部中桂枝等五味者是也）承氣入胃裏平則亡（承氣湯在此卷仲景日數部中三味者是也）此表裏虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹為治乃誤使病者殞殁自謂其分至令冤魂塞於冥路死

尸盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟千金同

又凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷生意者乃云神丹甘遂合而服之且解其外又除其內言巧似是於理實違安危之變豈不詭哉夫病發熱而惡寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者可攻其外發於陰者宜溫於內發表以桂枝溫裏以四逆四逆湯在第二卷傷寒不得眠部中三味者是也

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸即愈若不解者至二日在膚可法鍼服解肌散發汗汗出即愈若不解者至三日在肌復一發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在胷宜服藜蘆丸微吐則愈若病困藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蔕散吐之則愈視病尚未醒醒者復一法鍼之藜蘆丸近用損人不録之瓜蔕散在卷末雜療中范汪方二味者是也五日在腹六日入胃入胃則可下也若熱毒在胃外未入於胃而先下之者其熱乘虛便入胃則爛胃也然熱入胃病要當須復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有強弱病有難易攻效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣

若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以五苓散一方寸匕水和服之五苓散仲景云豬苓散是也在第二卷傷寒中風部中千金翼方五味者是也當以新汲井水強飲一升許若一升半可至二升益佳令以指刺喉中吐之病隨手愈不即吐者此病輩多不善勿強與水水停即結心下也當更以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此病不急以豬苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法鍼之尤佳

又云春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春天寒宜

服神丹丸亦可摩膏火灸（膏在雜療中黃膏七味白膏四味並范汪方是也）若末春夏月初秋凡此熱月不宜火灸又不宜厚覆宜服六物青散（青散在雜療中范汪方六物者是也）若崔文行度障散（度障散在雜療中范汪方四味者是也）赤散（赤散在雜療中范汪方七味者是也本出華佗）雪煎亦善（雪煎在雜療中古今錄驗方三味者是也）若無丸散及煎但單煮柴胡數兩傷寒時行並可服也不但一也至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脉朝夕駃（駃疏吏切疾也下同）者為實癖也朝平夕駃者非癖也轉湯為可早與但當少與勿令下多耳少與當數其間

病有虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實也不可下如此內外皆不可攻而師強攻之必遂損竭多死矣請虛煩但當行竹葉湯（竹葉湯在第三卷天行虛煩部中出文仲方是也）若嘔者與橘皮湯一劑不愈者可重與也（橘皮湯在第二卷傷寒嘔噦部中四味者是也出於深師方）此法宮泰數用甚效

傷寒後虛煩亦宜服此湯（仲景千金方同）

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何荅曰醫經云連發汗汗不出者死吾思可蒸之如蒸中風法蒸濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出卧單簟中冷得病但苦寒蜷諸醫與丸散湯四日之內凡八發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難使汗出者非但病使其然蒸之無不汗出也（小品千金同蒸法在此卷崔氏日數部中阮河南法又有桃葉湯熏身法在第三卷天行部中文仲方支太醫法是也）

范汪論黃帝問於岐伯曰人傷於寒而得病何以反更為熱岐伯曰極陰變陽寒盛則生熱熱盛則生寒諸病發熱惡寒脉浮洪者便宜發汗當發汗而其人適失血及大下利如之何岐伯荅曰數少與桂枝湯使體潤縶縶汗纔出連日如此自當解

也(千金同)
九卷云黄帝曰傷寒熱病死候有九(太素云不可刺者九)一曰汗不出大灌
發者死(太素云汗不出大顴發赤噦者死)二曰泄而腹滿甚者死(甚一作黄)三曰目不
明熱不已者死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出歐
下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄(女六反)汗不出
出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痙(巨郢反)者死熱病痙
者腰反折瘈(尺制反)瘲(子用反)齒噤(其禁反)齘也熱病七八日脉微
小病者便血口中乾一日半而死脉代者一日死熱病七八日
脉不躁不數後三日中有汗三日不汗四日死熱病已得汗而
脉尚躁盛此陰脉之極也死其得汗而脉靜者生熱病脉常
盛躁而不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗者生(甲乙太素同)
小品論曰古今相傳稱傷寒爲難療之病天行溫疫是毒病
之氣而論療者不別傷寒與天行溫疫爲異氣耳云傷寒是

雅士之辭云天行溫疫是田舍間號耳不說病之異同也考之
衆經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述其要焉出第十
卷中千金同
千金論曰人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂
安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時
生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故
有天行溫疫病者則天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理
不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢
之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移
亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命
曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解療皆
云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳則須救療迄
至於病愈湯食競進折其毒熱自然而差必不可令病氣自

在恣意攻人拱手待斃斯爲誤矣今博採羣經以爲上下兩卷廣設備擬好養生者可得詳焉

又夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胷心故頭痛胷中滿當吐之則愈五日以上氣沈結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當須消息爲候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脉微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下此醫之大禁也 文仲同

又脉有沈浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云時覺視病已積日其疹源結成非復發汗解肌所除當診其脉隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以内發汗者謂當風解衣夜卧失覆寒濕所中幷時有疾疫賊風之氣而相染易爲惡邪所中也至於人自飲食生冷過多腹藏不消轉動稍難頭痛身温其脉實大者便可吐下之不可發汗也

又凡人有少病若似不如平常則須早道若隱忍不療冀望自差須臾之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若天行不和當自戒勑若小有不和則須救療尋其邪由及在腠理以時早療鮮有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制止雖和緩亦無能爲也癰疽丁腫尤爲其急此自養之要也

又凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須療之也

又凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更與人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也能飲一斗者

與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦者不可與之飲而忽然汗出者已愈也人得病能飲水者欲愈也出第九卷中

經心録論曰傷寒病錯療禍及如反覆手耳故諺云有病不治自得中醫者論此疾也其病有相類者傷寒熱病風温濕病陰毒陽毒熱毒温疫天行節氣死生不同形候亦別宜審詳也出第二卷中

論傷寒日數病源并方二十一首

素問黃帝曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日閒其愈皆以十日以上者何也歧伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死帝曰願聞其狀歧伯曰一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脉夾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧三日少陽受之少陽主膽其脉循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六腑皆受病榮衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

帝曰治之奈何歧伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

又帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形何如歧伯曰兩

傷於寒病者脉一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴也二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫（之廉反作讝）言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入不知人則六日而死

帝曰五藏已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死出第九卷中（甲乙太素同）

病源傷寒一日太陽受病太陽者小腸之經也為三陽之首故先受病其脉絡於腰脊主於頭項故得病一日而頭項背膊腰脊痛也

又傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脉絡鼻入目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈出第七卷中

仲景傷寒論傷寒一二日心中悸而煩者小建中湯主之方

桂心（三兩） 甘草（二兩炙）
生薑（三兩） 大棗（十二枚擘）
膠飴（一升） 芍藥（六兩）

右六味切以水七升先煑五味取三升去滓內飴更上微火銷令解温服一升日三服如嘔家不可服建中湯以甜故也忌海藻菘菜生葱千金翼同出第三卷中（張仲景傷寒論傷寒一二日內麻黃湯主之此云小建中湯非也此方但治心中悸而煩）

病源傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脉循於脅上於頸耳故得病三日胸脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故皆可汗而解出第七卷中

仲景傷寒論療太陽病三日發其汗病不解蒸蒸發熱者屬調胃承氣湯方

甘草二兩炙　芒消半斤　大黃四兩

右三味切以水三升煑取一升去滓內芒消更煑微沸温温頓服以調胃氣則愈忌海藻菘菜經心録同出第十卷中張仲景傷寒論三日亦可服麻黃湯此云調胃承氣湯非也此方但治三日發汗不解蒸蒸發熱者

病源傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也爲三陰之首是知三日以前陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脉絡於脾主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾也其病在胷膈故可吐而愈

又傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脉貫腎絡肺繫於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而愈矣並出第七卷中

仲景傷寒論傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足温而渴者小柴胡湯主之方

柴胡半斤　栝樓根四兩內少黃脉者　桂心三兩　黃芩二兩

牡蠣二兩　甘草二兩炙　乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升温服一升日三服初服微煩温覆汗出者便愈也忌生葱海藻菘菜范汪同出第三卷中張仲景傷寒論名柴胡薑桂也合用柴胡人參甘草黃芩半夏生薑大棗七味小柴胡湯是也玉函千金翼同

病源傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胃故可下而愈

又傷寒七日太陽病衰頭痛少愈傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病盡故也今七日以後病反甚不除者欲爲再經病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也並出第七卷中

仲景傷寒論療傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其人小便反清一本作大便反青者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者

必効宜桂枝湯方

桂枝（三兩）　芍藥（三兩）　甘草（二兩炙）

生薑（三兩）　大棗（十二枚擘）

右五味切以水七升煮取三升去滓溫服一升須臾啜稀粥一升助藥力覆取微汗忌生葱海藻菘菜集驗備急文仲范汪同（張仲景傷寒論此方六七日病在表者可服之）

又傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以佗藥下之柴胡證仍在故可與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解

病源傷寒八日陽明病衰身熱少愈傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病證猶存也

又傷寒九日少陽病衰耳聾微聞傷寒九日以上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已畢又重感於寒故日數多而病候改變出第七卷中

仲景傷寒論療傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴下之脉浮虛而濇者屬桂枝附子湯若大便鞕小便自利者附子白朮湯方

桂枝附子湯方

桂心（四兩）　附子（三枚炮去皮）　生薑（三兩）

甘草（二兩炙）　大棗（十二枚擘）

右五味切以水六升煮取二升去滓溫分三服忌生葱猪肉海藻菘菜

附子白朮湯方

白朮（四兩）　大棗（十二枚擘）　甘草（二兩炙）

生薑（三兩）　附子（三枚炮去皮四破）

右五味切以水六升煑取二升去滓分溫三服初一服其人身如痺半日許復服之都盡其人如冒狀者勿怪此以附子朮併走皮中逐水氣未除故使人如冒狀也本云附子一枚今加之二枚名附子湯忌生葱豬肉菘菜海藻桃李雀肉等千金翼同出第十一卷中（張仲景論法當加桂枝四兩此本一方二法以大便鞕小便自利故去桂也以大便不鞕小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之此二方但治風濕非治傷寒也）

病源傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚔十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣出第七卷中（素問甲乙太素並同）

仲景傷寒論療吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘但發熱譫（譫訓戲今荒語也）語者屬大承氣湯方

大黃（四兩去皮）　陳枳實（五枚炙）　芒消（三合）　厚朴（半斤）

右四味切以水一斗先煑二物取五升去滓內大黃煑取二升去滓內芒消煑一二沸分爲再服初一服便得利者止後服不必盡劑千金方并翼同出第五卷中

又太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急（一云嘔止小安）鬱鬱微煩者爲未解也可與大柴胡湯下之即愈方

柴胡（半斤）　黃芩　芍藥（各三兩）　半夏（半升水洗）

大棗（十二枚擘）　生薑（五兩）　枳實（四枚炙）

右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩今不加大黃恐不名爲大柴胡湯也忌羊肉餳兼主天行千金翼肘後同

又傷寒十三日不解胷脅滿而嘔日晡所發潮熱畢而微利

此本柴胡湯下之不得利今反利者知醫以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒消湯主之方

柴胡二兩十六銖 黃芩 人參 甘草炙

生薑各一兩 半夏五枚 大棗四枚擘 芒消二合

右八味切以水四升煮取二升去滓下芒消更上火煎一二沸分爲再服未解更作忌海藻菘菜羊肉餳等 經一方芒消三合桑螵蛸五箇大黃四分煮取一升半溫服五合微下愈本云柴胡湯再服以解其外餘一升加芒消大黃桑螵蛸也 玉函

肘後方七首

肘後療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療者若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作此葱豉湯方

葱白一握 豉一升綿裹

右二味以水三升煮取一升頓服取汗若汗不出更作加葛根三兩一方更加升麻三兩水五升煮取二升分溫再服徐徐服亦得必得汗即差若不得汗更作加麻黃三兩去節服取汗出爲効文仲同

又方

葱白一握切 米三合 豉一升

右三味以水一斗煮米少時下豉後內葱白令大熟取三升分溫三服則汗出

又方

豉一升綿裹

右一味以童子小便三升煮取二升分溫再服汗出爲効集驗方加葱白一升切云神良支太醫文仲備急同

葛根四兩切

右一味以水一斗煮取三升內豉一升更煮取一升半分温

再服取汗爲差又云擣生葛根汁一二升服亦佳

又療傷寒汗出不歇已三四日胷中惡欲令者方

豉三升綿裹　鹽一兩

右二味以水七升煮取二升半去滓內蜜一升又煮三沸頓

服一升安卧當吐如不吐更服一升取吐爲効

又方

苦參二分　甘草一分炙　瓜蔕

赤小豆各二七枚

右四味切以水一升煮取半升一服之當吐吐不止者作葱

豉粥解之必止忌海藻菘菜

又方

苦參二兩　黄芩二兩　生地黄半斤

右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忌蕪荑

深師方四首

深師療傷寒一日至三日應汗者作此湯方

葛根半斤　烏梅十四枚　葱白一握　豉一升綿裹

右四味切以水九升煮取三升分爲三服初一服便厚覆

取汗汗出粉之

又麻黄解肌湯療傷寒三四日煩疼不解者方

麻黄三兩去節　桂心二兩　甘草一兩炙　杏人七十枚去尖皮碎

右四味切以水九升先煮麻黄減二升掠去沫乃內諸藥合

煮取二升半絞去滓分服八合以汗出爲度忌海藻菘菜

生葱本仲景麻黄湯千金并翼同

又黄芩湯療傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利胷脅

痞滿微熱而煩方

黄芩　桂心各三兩

前胡八兩　半夏半升洗　茯苓四兩

右五味切以水一斗二升煮取六升分爲六服日三服夜三服間食生薑粥投取小便利爲度忌羊肉餳生葱酢物

又石膏湯療傷寒病已八九日三焦熱其脉滑數昏憒身體壯熱沈重拘攣或時呼呻而已攻内體猶沈重拘攣由表未解今直用解毒湯則攣急不差直用汗藥則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黄湯以救其内有所增加以解其外是故名石膏湯方

石膏　黄連　黄蘗　黄芩各二兩

香豉一升綿裹　梔子十枚擘　麻黄三兩去節

右七味切以水一斗煮取三升分爲三服一日併服出汗初服一劑小汗其後更合一劑分兩日服常令微汗出拘攣煩憒即差得數行利心開令語毒折也忌猪肉冷水出第十四卷中

小品方四首

小品詔書發汗白薇散療傷寒二日不解方

白薇二兩　麻黄七分去節　杏人去皮尖熬　貝母各三分

右四味擣散酒服方寸匕自覆卧汗出則愈古今録驗千金同

又雞子湯療發汗後二三日不解頭痛肉熱方

麻黄一兩去節　甘草一分炙

右二味切以水二升扣雞子白令置於水内合和令勻内藥復攪令和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之蓋覆汗出粉傅之有効忌海藻菘菜古今録驗備急同張文仲療天行

又葛根湯療病三四日不差身體毒熱方

葛根（八兩） 生薑（三兩） 龍膽 大青（各半兩）

桂心 甘草（炙） 麻黃（去節各二兩） 萎蕤

芍藥 黃芩 石膏（碎） 升麻（各一兩）

右十二味切以水一斗先煑葛根麻黃取八升掠去沫然內餘藥煑取三升分三服日二夜一服忌海藻菘菜生葱

千金同

又療傷寒六七日其人大下寸脉沈遲手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止者麻黃升麻湯方

麻黃（二兩半去節） 升麻（五分） 當歸（五分）

知母 萎蕤（一作昌蒲） 黃芩（各三分）

麥門冬（去心一作天門冬） 桂心 芍藥

乾薑 石膏（碎） 甘草（炙）

茯苓 白朮（各一分）

右十四味切以水一斗先煑麻黃減二升掠去上沫內諸藥煑取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令盡汗出便愈忌海藻菘菜生葱醋桃李雀肉等並出第六卷中（此張仲景傷寒論方）

集驗方五首

集驗療傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者方

眞丹砂（一兩）

右一味以水一斗煑之取一升頓服之覆取汗忌生血物千金同

又療疫氣傷寒三日以後不解者方

好豉（一升綿裹） 葱白（切一升）

右二味童子小便五升煑取二升分再服覆取汗神効千金同

又療傷寒五六日斑出以後湯方

豬膽三合 雞子一枚 苦酒三合

右三物合和煎令三沸強人盡服之羸人煎六七沸分爲兩服取汗出爲效文仲備急千金同

又療傷寒七八日不解默默煩悶腹中有乾糞譫語大柴胡湯方

柴胡 半夏湯洗各八兩 生薑四兩 知母

芍藥 大黃 甘草炙 萎蕤各二兩

一方加枳實四枚黃芩二兩

右十味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳范汪加人參三兩餘並同千金用芍藥不用枳實

又療傷寒熱病十日以上發汗不解及吐下後諸熱不除及下利不止斑出方

大青四兩 甘草炙二兩 阿膠炙末二兩 豉一升綿裹

右四味切以水八升煮二物取三升半去滓內豉煮三沸去滓乃內膠令烊分溫三服欲盡更作常使有餘渴者當飲但除熱止吐下無毒忌海藻菘菜肘後深師千金同出第二卷中

千金方六首合一十一法

千金治傷寒頭痛項強四肢煩疼青膏方一日在右語中

當歸 芎藭 吳茱萸 附子

烏頭 莽草 蜀椒各三兩 白芷三兩

右八味切以醇苦酒漬再宿以豬脂四斤緩火煎候白芷色黃絞去滓以煖酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳忌猪肉

又少陰病得病二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

又少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

又陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖堅大便反易色必黑宜抵党湯下之

又傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲有血不可餘藥宜抵党丸

又太陽病身黃脉沈結少腹堅小便不利者此爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜抵党湯下之

又陽明病脉遲雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此爲大便已堅宜承氣湯主之若汗多而微發熱惡寒爲外未解宜桂枝湯其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不大便可少與承氣湯微和其胃氣勿令至大下

又陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅者勿與之若不大便六七日恐胃中有燥糞欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣者爲有燥糞乃可攻之若不轉失氣者此爲但頭堅後溏不可攻之攻之必脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅與小承氣湯和之不轉失氣者愼不可攻之

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也直視譫語喘滿者死若下利者亦死

又傷寒四五日脉沈喘滿沈爲在裏而反發汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語

承氣湯方

枳實五枚陳者炙　大黃四兩　芒消三合　厚朴半斤

右四味切以水一斗先煮二味取五升內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服也

小承氣湯方

大黃四兩　厚朴二兩炙　枳實大者三枚炙

右三味切以水四升煮取一升二合去滓分溫再服若一服
得利譫語止勿服之也

又抵党丸方

水蛭二十枚熬　桃人二十五枚去皮尖兩人　䖟蟲二十枚去足翅熬　大黃三兩

右四味末下篩合分爲四丸以水一斗煮一丸取七合頓服
晬時當下血不下更須服之取血下爲效

又抵党湯方

水蛭熬　䖟蟲去足翅熬各三十枚　桃人二十枚去兩人尖皮　大黃三兩

右四味切以水五升煮取三升分爲三服不下更服

又療傷寒頭痛壯熱百節疼痛湯方

柴胡　芍藥　大青　知母

梔子人各四兩　升麻　黃芩　杏人去雙人皮尖各三兩

香豉一升綿裹　石膏八兩碎

右十味切以水九升煮取二升七合分三服若熱盛者加
大黃四兩並出第十卷中

千金翼方一十三首合一十三法

千金翼療少陰病一二日口中和其背惡寒者當灸之服附
子湯方

大附子二枚炮　茯苓　芍藥各三兩

人參二兩　白术四兩

右五味切以水八升煮取三升溫服一升日三忌豬肉桃李
雀肉酢

又療少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯

甘草湯方

甘草二兩

右一味切以水三升煮取一升半服七合日三服忌海藻菘菜

又桔梗湯方

大桔梗一兩　甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升分兩服吐膿血矣忌猪肉海藻菘菜

又療少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止而便膿血

桃華湯方

赤石脂一斤一半全用綿裹一半篩末　乾薑一兩切　粳米一升

右三味以水七升煮取米熟去滓服七合内赤石脂末一方寸匕日三服傷寒論千金崔氏范汪同

又療少陰病得之二三日已上心中煩不得卧者黄連阿膠湯主之方

黄連四兩　黄芩一兩　雞子中黄二枚

芍藥二兩　阿膠三兩炙一云三片

右五味切以水六升先煮三味取二升去滓内膠煮烊盡小冷内雞子黄攪令相得温服七合日三服忌猪肉冷水並出第十卷中

又療傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞堅或心下卒悸小便不利或不渴外有微熱或欬小柴胡湯方

柴胡八兩　半夏半升洗　生薑　黄芩

人參　甘草各三兩炙　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升温服一升日三服但胷中煩而不嘔者去半夏加人參加栝樓實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半栝樓根四兩若腹中痛者去黄芩加芍藥三兩若脅下痞堅者去大棗加牡蠣六兩若心下卒悸小便不利者去黄芩加茯苓四兩若

不渴外有微熱者去人參加桂心三兩溫覆取微汗若欬
者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩忌羊肉餳
海藻菘菜雀氏深師同

又療傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此爲未解梔
子湯方

肥梔子 十四枚擘　美豉 四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子取二升半去滓內豉更煮取一
升半去滓溫分再服若一服得吐餘更勿服之若嘔者後梔
子加生薑湯傷寒論備急同傷寒兼療不得眠

又梔子生薑湯方

肥梔子 十四枚擘　美豉 四合　生薑 五兩切

右三味以水四升煮梔子生薑取二升半去滓內豉更煮取
一升半去滓溫分再服若一服安即勿服傷寒論同並療
虛煩不得眠耳

又傷寒六七日結胸熱實其脉沈緊心下痛按之如石堅大
陷胸湯主之方

大黃 六兩切　甘遂末 一錢匕　芒消 一升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消煮一兩沸
乃內甘遂末溫分再服得快利止後服

又傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時
惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎湯主之

又諸亡血家不可與白虎湯虛者亦不可與卒得之腹痛而
利者但可溫之

又傷寒無大熱而口乾渴心煩其背微惡寒者白虎湯主之

又傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水
無表證者白虎湯主之方

知母六兩 石膏一升碎綿裹 甘草三兩炙 粳米六合

右四味切以水一斗二升煮取米熟去米内藥煮取六升去滓分六服日三服忌海藻菘菜千金傷寒論備急文仲崔氏范汪經心録同諸家兼療天行之病

又白虎湯方

石膏 粳米各一升 知母六兩

甘草二兩炙 人參三兩

右五味切以水一斗二升煮米熟内藥煮取六升去滓分服一升日三服此方立秋後立春前不可行白虎湯正二三月時尚冷亦不可與服與之則嘔利而腹痛忌海藻菘菜

又療傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利諴語謊語一身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡四兩 黃芩 生薑 龍骨

人參 牡蠣熬 鉛丹 桂心

茯苓各一兩半 半夏二合半湯洗 大棗六枚擘 大黃二兩

右十二味切以水八升煮取四升内大黃切如博棊子煮取二升去滓溫分再服忌羊肉餳生葱酢物

又陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無有劑頸而還小便不利渴引水漿此爲瘀熱在裏身必發黃宜服茵蔯湯方

茵蔯六兩 大肥梔子十四枚擘 大黃二兩

右三味切以水一斗二升先煮茵蔯減六升去滓内諸藥煮取三升分三服小便當利如皁莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去並出第九卷中

崔氏方一十五首

崔氏療傷寒始得一二日方

便可灸項三壯又灸大椎三壯各加至五炷益良用之
驗大椎平肩斜齊高大者是也仍不得侵項分取之則
非也上接項骨下肩齊在椎骨節上是餘穴盡在節下
凡灸刺不得失之毫釐今崔氏不定高下是以言之出
黃帝鍼灸經

又療傷寒一日至三日可發汗度瘴散方

麻黃十分去節　桔梗　蜀椒汗　細辛
白朮　吳茱萸　防風各四分　烏頭炮
乾薑　桂心各五分

右十味擣篩爲散溫酒服方寸匕溫覆取汗或數服得汗
即止若得病一二日而輕者服此藥皆得汗解若得便重者
煩不能解也然可以二大豆許著鼻孔中覺燥涕出一日
可三四著必愈兼辟天行病忌猪肉生葱生菜桃李雀

肉等

又療傷寒勑色惡寒發熱體疼發汗神丹丸方

人參五分　烏頭四分炮　半夏五分洗
茯苓五分　朱砂一分研　附子四分炮

右六味擣爲末蜜和丸如大豆每服三丸生薑湯下發汗出
令體中濈濈然如汗未出更以熱粥投之令汗出若汗少不
解復如前法若得汗足不解當服桂枝湯此藥多毒飲水
解其熱愈周護軍子期自說天行用之甚良故記之忌豬
羊肉大酢生血物等刪繁范汪同兼主天行

又療傷寒服度瘴散而不汗出者便作葱豉湯方

葱十四莖　豉一升綿裹

右二味以水三升煑取一升頓服溫暖覆取汗出勝度瘴散
也與前附後方重

又療傷寒服葱豉湯不得汗可服葛根湯方

葱白十四莖　豉一升綿裹　葛根三兩切

右三味以水五升煮取二升分爲再服溫覆取汗汗止汗不出更服余時用此一服輒汗略不再服救數十人甚效

又療傷寒前軍府直吏周虎服葛根湯再服不得汗余更視之甚惡寒而拘急更思作麻黄湯以解之方

麻黄二兩去節　葛根三兩　葱白十四莖　豉一升綿裹

右四味切以水七升煮取二升半分三服虎再服快汗愈其疹與周虎相似者服之皆汗十餘人差

又療傷寒阮河南蒸法

薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃葉桑柘葉諸禾糠及麥麫皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此等物著火處令厚二三寸布席卧上溫覆用此發汗汗皆出若過熱當審細消息大熱者可重席汗出周身輒使止當以溫粉粉身勿令遇風

又療傷寒三五日疑有黄則宜服此油方

取生烏麻清油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟攪令相得作一服令盡

又小前胡湯療傷寒六七日不解寒熱往來胷脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛方　胡洽云出張仲景

前胡八兩　半夏半升洗　生薑五兩　黄芩

人參　甘草各三兩炙　乾棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取三升分四服古今錄驗同忌羊肉餳海藻菘菜　仲景方用茈胡不用前胡今詳此方治寒疝腹痛恐性涼耳合用仲景茈胡桂薑湯今崔氏用之未知其可也

又療傷寒或始得至七八日不大便或四五日後不大便或下後祕塞者承氣湯方

厚朴炙　大黄各三兩　枳實六片炙

右三物切以水五升煑取二升體強者服一升羸者服七合得下必效止范汪同

又若胃中有燥糞令人錯語正熱盛亦令人錯語若祕而錯語者宜服承氣湯通利而錯語者宜服下四物黄連除熱湯承氣湯舊用芒消余以有毒故去之用之數年安穩得下良既服湯亦應外用生薑兑讀作銳下同使必去燥糞若服湯兼兑而並不得下者可依本方芒消一兩

又薑兑法

削生薑如小指長二寸鹽塗之内下部中立通

又方

以猪膽灌下部用亦立通張仲景傷寒論云猪膽和法醋少許灌穀道中

又前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧余思作此黄連解毒湯方

黄連三兩　黄芩　黄蘗各二兩　梔子十四枚擘

右四味切以水六升煑取二升分二服一服目明再服進粥於此漸差余以療凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆佳傳語諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者此湯療五日中神效忌猪肉冷水

又大前胡湯療傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛内外有熱煩嘔不安方胡洽云出張仲景

前胡半斤　半夏半升洗　生薑五兩　枳實八片炙

芍藥四兩　黄芩三兩　乾棗十二枚擘

右七味切以水一斗煑取三升分四服日三夜一服古今録

國立故宮博物院 NATIONAL PALACE MUSEUM

驗同忌羊肉餳等物張仲景用柴胡不用前胡本云加大黃二兩不加大黃恐不名大柴胡湯

又凡少陰病寒多表無熱但苦煩憒默默而極不欲見光有時腹痛其脉沈細而不喜渴經日不差舊用四順湯余根其熱不甚用也若少陰病下利而體猶有熱者可服黃連龍骨湯若已十餘日而下利不止手足徹冷及無熱候者可服增損四順湯方黃連龍骨湯見第三卷天行中

甘草二兩炙　人參二兩　龍骨二兩

黃連　乾薑各一兩　附子中形者一枚炮去黑皮

右六味切以水六升煮取二升分再服不差復作甚良若下而腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩忌海藻菘菜豬肉冷水

又療少陰病二十日後下不止可服陟釐丸浩京方

陟釐四兩不用鹹者　當歸四兩　漢防己三兩　黃連三兩

紫石英別擣末細研三兩　豉三升　厚朴二兩炙　苦酒五升

右八味切以二升苦酒漬防已一宿出切炙之燥復內苦酒中盡止又以三升苦酒漬豉一宿小蒸之研絞取汁擣下篩諸藥以酒豉汁和之丸如梧桐子大冷漿水服二十丸丸極燥乃可服之忌豬肉冷水並出第一卷中

張文仲方一十首

張文仲葛氏療傷寒及温病頭痛壯熱脉盛始得一二日方

破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煮一升水令沸以雞子水投其湯中急攪調適寒温頓服覆取汗備急同

又療傷寒二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡半斤　人參　甘草炙　黃芩

生薑各三兩　半夏五合洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煑取三升分三服微覆取汗半日便差不差更服一劑忌羊肉餳海藻菘菜備急范汪同與前千金翼方重

又療傷寒温病等三日以上胷中滿陶氏云若傷寒温病已三四日胷中惡欲令吐者服酒膽方

苦酒半升　豬膽一枚

右二味盡和服之吐則愈神驗支云去毒氣妙胡洽集驗備急千金同

又療傷寒近效方凡胷中惡淡飲傷寒熱病瘴瘧須吐者方

鹽末一大匙

右一味以生熟湯調下須臾則吐吐不快明旦更服甚良備急同

又瓜蔕散主傷寒胷中痞塞宜吐之方

瓜蔕　赤小豆各一兩

右二味擣散白湯服一錢匕取得吐去病差止備急經心録范汪同

又療傷寒已四五日頭痛體痛肉熱如火病入腸胃宜利瀉之方

生麥門冬一升去心　生地黄切一升　知母二兩

生薑五兩半　芒消二兩半

右五味以水八升煑取二升半内芒消煎五沸分五服取利爲度忌蕪荑備急同

又療傷寒五日以上宜取下利陶氏云若汗出大便堅而譫語方

大黄四兩　厚朴二兩炙　枳實四枚炙

右三味以水四升煑取一升二合分兩服通者一服止此是仲景方備急范汪同與前千金崔氏方重

又療傷寒八九日不差名爲敗傷寒諸藥不能消者方

鼈甲炙　蜀升麻　前胡
烏梅　枳實炙　犀角屑
黃芩各二兩　甘草一兩炙　生地黃八合
右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二服出
支太醫方忌海藻菘菜莧菜蕪荑備急方同
又若十餘日不大便者服承氣丸方
大黃　杏人去皮尖破熬各二兩　枳實一兩炙　芒消一合
右四味擣下篩蜜和丸如彈子以生薑湯六七合研一丸服
之須臾即通不通更服一丸取通爲度備急同
又療晚發傷寒三月至年末爲晚發方
生地黃一斤打碎　梔子二十枚擘　升麻三兩
柴胡　石膏各五兩
右五味切以水八升煮取三升分五服頻頻服若不解更服
若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升煮取三升
分三服忌蕪荑備急同並出第二卷中

古今録驗方八首

古今録驗陽毒湯療傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後
變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見神鬼或吐血
下利其脉浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛唾膿血五日可療
至七日不可療也宜服升麻湯方
升麻二分　當歸二分　蜀椒汗一分　雄黃研
梔子　桂心各一分　甘草二分炙　鼈甲大如手一片炙
右八味切以水五升煮取二升半分三服如人行五里久再
服温覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服亦取得吐佳
陰毒去雄黃忌海藻菘菜生葱莧菜　張仲景方無梔子桂心陰毒去雄黃蜀椒
又陰毒湯療傷寒初病一二日便結成陰毒或服湯藥六七日

以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛喉咽不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數一本無數字 仲景云此陰毒之候身如被打五六日可療至七日不可療宜服甘草湯方

甘草炙　升麻　當歸各二分
蜀椒一分出汗　鼈甲大如手一片炙

右五味切以水五升煮取二升半分再服如人行五里頃復服溫覆當出汗汗出則愈若不得汗則不解當重服令汗出忌海藻菘菜莧菜千金集驗備急文仲小品肘後同並出第二卷中

又還魂丸療傷寒四五日及數年諸癖結堅心下飲食不消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃逆滿腸鳴兩脇裏急飛尸鬼注邪氣或爲驚恐傷瘦背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有時風溫不能久住吐惡水方

巴豆去心皮熬　甘草炙　朱砂
芍藥各二兩　麥門冬二兩去心

右五味各擣下篩合和以蜜擣三千下丸如梧桐子大每服兩丸葱棗湯下小兒二歲以上服如麻子太二丸日二服忌海藻菘菜野猪肉蘆笋生血物出第三卷中

又麥奴丸療傷寒五六日以上不解熱在胷中口噤不能言唯欲飲水爲敗傷寒醫所不療方

麻黃去節　大黃　芒消
竈突中墨　黃芩各二分　麥奴
梁上塵　釜底墨各一分

右八味擣篩蜜和如彈丸以新汲水五合研一丸病者渴欲飲水但極飲冷水不節升數須臾當寒寒訖汗出則愈若

日移五丈不汗依前法服一丸以微利止藥勢盡乃食當冷食以除藥勢一名黑奴丸小麥黑勃名為麥奴是也肘後胡洽小品刪繁張文仲深師范汪經心録廣濟並同

又解肌湯療傷寒發熱身體疼痛方

葛根四兩　麻黄去節　茯苓各三兩　牡蠣二兩熬

右四味切以水八升煮取三升分三服徐徐服之得汗通則止忌酢物千金有生薑甘草

又調中湯療夏月及初秋忽有暴寒折於盛熱熱結四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下痢或血或水或赤帶下壯熱且悶脉微且數宜下之方

大黄　葛根　黄芩

芍藥　桔梗　茯苓

藁本　白术　甘草炙各二兩

右九味以水九升煮取三升分三服服別相去二食久勿以食隔須取快下壯熱便歇其下亦止也凡秋夏旱熱積日忽有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃為六腑之長最易得傷非意暴寒傷之而下也虛冷人則不在壯熱但下痢或霍亂也少實人有服五石人喜壯熱其適與藥喫斷下則加熱喜悶而死矣亦有不止便作壅熱毒壯熱甚不歇則劇是以宜此調中湯下之和其胃氣其表熱者宜前胡大黄下之也忌海藻菘菜猪肉酢物桃李雀肉等

又療往來寒熱胷脅逆滿桃人承氣湯方

大黄四兩別漬下　甘草炙　芒消湯成下

桂心各二兩　桃人五十枚去皮尖碎

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更煎一兩沸溫分三服太醫校尉史脱方肘後傷寒論千金翼同忌海藻

菘菜並出第二卷中

雜療傷寒湯散丸方八首(並是論中所要者)

范汪療傷寒勑色頭痛頸強賊風走風黃膏方

大黃　附子　細辛　乾薑

蜀椒(去目)　桂心(各一兩)　巴豆(好者五十枚去皮)

右七味各切以淳苦酒漬藥一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒勑色發熱酒服如梧桐子許又以摩身數百遍兼療賊風絕良風走肌膚追風所在摩之巳用有效此趙泉方千金同忌野猪肉生葱生菜蘆笋

又療傷寒白膏摩體中手當千遍藥力乃行并療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆療之先以鹽湯洗惡瘡布拭之著膏瘡腫上摩向火千遍日再自消方

天雄　烏頭(炮)　莽草　羊躑躅(各三兩)

右四味各切以苦酒三升漬一宿作東向露竈又作十二聚濕土各一升許成煎猪脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪為火令膏釋内所漬藥炊令沸下著土聚上沸定頃上火煎如此十二過令土聚盡遍藥成絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚温覆取汗咽痛含如棗核日三咽之不可近目千金同忌豬肉等

又崔文行解散療傷寒發熱者方(一名度瘴散)

烏頭(一斤燒)　桔梗　細辛(各四兩)　白术(八兩)

右四味擣散皆令盡若中寒服一錢匕覆取汗若不覺復少增服之以知為度時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服忌生菜豬肉桃李雀肉等千金同

又六物青散療傷寒勑色惡寒者方(勑通作赤)

烏頭(炮)　桔梗　白术(各十五分)

附子 炮五分　防風　細辛

右六味擣篩爲散温酒服錢五匕不知稍增服後食頃不汗出者飲薄薄粥一升以發之温覆汗出濈濈可也勿令流離勿出手足也汗微出勿粉若汗大出不止温粉粉之不得汗者當更服之得汗而不解當服神丹丸千金同忌生菜猪肉桃李雀肉等

又服桂枝湯大汗出後脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一日再發者汗出便解屬桂枝二麻黄一湯主之方

桂心 一兩十七銖　杏人 十六枚去尖皮　芍藥 一兩六銖　麻黄 一兩十六銖去節

生薑 一兩六銖切　甘草 炙一兩二銖　大棗 五枚擘

右七味切以水五升先煑麻黄一兩沸掠去沫乃内諸藥煑得二升去滓温服一升日再本云桂枝湯二分麻黄湯一分合爲二升分再服今合爲一方忌海藻菘菜生葱 本張仲景傷寒論方集驗療天行

又療傷寒及天行瓜蔕散吐方

赤小豆 一兩　瓜蔕 一兩

右二味擣作散温湯二合服一錢匕藥下便卧若吐便且急忍也候食頃不吐者取錢五匕散二合湯和服之便吐矣不吐復稍增以吐爲度吐出青黄如菜汁者五升以上爲佳若吐少病不除者明日如前法復服之可至再三不令人虚也藥力過時不吐服湯一升助藥力也吐出便可食無復餘毒若服藥過多者益飲冷水解之 與前張文仲方重

又療傷寒熱病辟毒氣疫病七物赤散方

朱砂　烏頭 炮各二兩　細辛　躑躅

乾薑　白朮 各一兩　栝樓 一兩半

右藥擣散服半錢匕用酒調服汗出解不解增至一錢匕除邪氣消疫癘忌桃李雀肉生菜豬肉生血物等出第二

十一卷中

又療傷寒雪煎方

麻黃十斤去節　杏人四升去兩人尖皮熬擣爲膏　大黃一斤十三兩金色者各細剉

右三味以雪水五石四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿入大黃攪調炊以桑薪煑至二石去滓復於釜中下杏人膏煎至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎得二斗六升其藥巳成可丸如彈子大有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服立汗出若不愈者復服一丸密封藥勿令泄氣也此本出第三卷中千金同

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴　宗元　校正

外臺秘要方卷第一

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺秘要方卷第二 傷寒下二十一門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億 等上進

傷寒中風方九首
傷寒結胷方七首
傷寒嘔噦方一十四首
傷寒喉咽痛方八首
傷寒吐唾血及下血方三首
傷寒衄血方四首
傷寒煩渴方九首
傷寒癖實及宿食不消方二首
傷寒春冬欬嗽方三首
傷寒攻目生瘡兼赤白瞖方六首
傷寒口瘡方二首

傷寒手足欲脫疼痛方八首

傷寒虛羸方四首

傷寒不得眠方四首

傷寒小便不利方九首

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒䘌瘡方一十首

傷寒陰陽易方八首

傷寒勞復食復方二十五首

傷寒百合病方七首

傷寒狐惑病方四首

傷寒中風方九首（臣億等按傷寒論傷寒中風自是兩疾今云傷寒中風非）

病源中風傷寒之狀太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出濇濇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔此其候也

太陽中風以火刼發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身即發黃陽盛則欲衄（女六反）陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語（荒語也本作譫）甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可療

陽明中風口苦而咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮緊若下之則腹滿小便難

陽明病若能食爲中風不能食爲中寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐下之則悸（其季反）而驚

太陰中風四肢煩疼其脉陽微陰濇而長者爲欲愈

少陰中風其脉陽微陰浮者爲欲愈

厥陰中風其脉微浮者爲欲愈不浮爲未愈仲景傷寒論同並出第七卷中

仲景傷寒論桂枝湯療太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔方

桂心　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五物切薑擘棗次切餘藥以水七升煑棗令爛去滓乃内諸藥水少者益之煑令微微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初一服便得汗出者後服小小闊其間如不得汗者小小促之令其藥勢相及汗出自護如服六物青散法若病重者宜夜服特須避風若服一劑晬時不解病證不變者當更服之至有不肯汗出服二三劑乃愈服此藥食頃亦當飲熱粥以助藥力若初得病甚便以火發汗火氣太過汗出不解煩躁不得寐因此湯加龍骨牡蠣各三兩減桂心生薑各一兩不用芍藥若虛勞裏急腹中痛者取前桂枝湯二升加膠飴音夷錫也一升適寒温分再服若得大汗出者只用桂枝二兩發汗後重發汗亡陽譫語其脉反和者不死發汗已解半日所重發煩其脉浮數可復發汗宜桂枝湯方在上出第二卷中千金胡洽集驗文仲備急范汪同忌海藻生葱菘菜等物

又療傷寒頭疼腰痛身體骨節疼發熱惡風汗不出而喘麻黃湯方

麻黃三兩去節　桂心二兩　甘草一兩炙　杏人七十枚去皮兩人尖碎

右四味切以水九升煑麻黃減二升去上沫内諸藥煑取二升半去滓服八合覆取微汗不須歠粥餘如桂枝法將息忌海藻菘菜生葱　臣億等按張仲景傷寒論麻黃湯惟主傷寒不主中風若中風但可服前桂枝湯

又療太陽病項背強几几反汗不出惡風者屬葛根湯方

葛根四兩　麻黃四兩去節　甘草二兩炙　芍藥

柀

桂心各二兩　生薑三兩　大棗十二枚擘
右七味切以水一斗煮麻黃葛根減二升去上沫内諸藥煮
取三升去滓温服一升覆取微似汗出不須喫熱粥助藥發
汗餘將息依桂枝法忌海藻菘菜生葱並出第三卷中張仲景傷寒論
治中風汗出用桂枝此證云汗不出亦傷寒之病非中風也
小品萎蕤湯療冬温及春月中風傷寒則發熱頭眩痛喉咽乾
舌強胷内疼心胷痞結音柀病也滿腰背強方
萎蕤二兩　石膏三分末綿裹　白薇二兩　麻黃二兩去節
獨活二兩　杏人二兩去皮尖兩人　芎藭二兩　甘草二兩炙
青木香二兩無可用麝香一分代之
右九味切以水八升煮取三升分三服取汗若一寒一熱者
加朴消一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜並出第六卷中
古今錄驗同一方有葛根二兩

千金療傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔栝樓實湯方
栝樓實一兩　柴胡半斤　黃芩三兩　甘草三兩炙
生薑四兩切　大棗十枚擘破
右六味切之勿令大碎吹去末以水一斗二升煮得六升絞
去滓更煎取三升適寒温服一升日三服忌海藻菘菜出第
十卷中
千金翼療中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水飲
水而吐此為水逆五苓散主之方論云豬苓散也
豬苓三分　澤瀉五分　茯苓三分　桂心二分
白朮三分
右五味擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出愈忌桃李醋
物生葱雀肉等
又傷寒中風醫反下之其人下利日數十行水穀不化腹中雷

鳴心下痞音皷堅而滿乾嘔心煩不能得安醫見心下痞以爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方

甘草四兩炙 黄芩三兩 大棗十二枚擘 黄連一兩

乾薑三兩 半夏半升洗去滑

右六味切以水一斗煮取六升分六服忌海藻菘菜豬羊肉餳並出第九卷中一方有人參三兩

古今錄驗療中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風項頸強鼻鳴乾嘔陽旦湯主之方

大棗十二枚擘 桂心三兩 芍藥三兩 生薑三兩

甘草二兩炙 黄芩二兩

右六物㕮咀以泉水六升煮取四升分四服日三自汗者去桂心加附子一枚炮渴者去桂加栝樓三兩利者去芍藥桂加乾薑三累附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠飴半升分爲再服若脉浮緊發熱者不可與也忌海藻菘菜生葱等物千金同

又大青龍湯療太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛汗不出而煩躁方

麻黄六兩去節 桂心二兩 甘草二兩炙 石膏如雞子大碎綿裹

生薑三兩 杏人四十枚去兩人及尖皮 大棗十枚擘

右七味切以水九升先煮麻黄減二升去沫乃內諸藥煮取三升去滓分服一升厚覆取微汗汗出多者温粉粉之一服汗者不可再服若復服汗多亡陽逆虛惡風煩燥不得眠也忌海藻菘菜生葱等物並出第二卷中張仲景傷寒論云中風見傷寒脉者可服之

傷寒結胷方七首一十二法

病源結胷者謂熱毒氣結聚於心胷也此由病發於陽而早下

被

之熱氣乗虚而痞（音被結也）結不散也按之痛其脉寸口浮關上反自沉是也脉大不可下下之則死脉浮而大下之爲逆若陽脉浮關上細小沉緊而飲食如故時小便利者名爲藏結藏結病舌上白胎滑者爲難療不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之出第七卷中

張仲景傷寒論問曰病有結胷有藏結其狀如何荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名結胷也問曰何謂藏結荅曰如結胷狀飲食如故時時下利寸口脉浮關上小細而沉緊名藏結舌上白胎滑者爲難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也病發於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之（一作汗之）因作痞也所以成結胷者以下之太早故也

結胷證悉具煩躁者亦死

結胷證其脉浮大者不可下也下之則死

熬　告　堅

夫結胷病項亦強如柔痓（音熾惡也）狀下之則和宜大陷胷丸方

蜀大黄（半斤）　葶藶子（半升熬）　杏人（半升去皮尖熬令赤黒色）

芒消（半升）

右四味擣篩二味杏人合芒消研如泥和散合和丸如彈子大毎服一丸用甘遂末一錢匕白蜜一兩水二升同煮取一升温頓服之一宿乃自下如不下更服取下爲效千金翼同

又太陽病脉浮動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虚頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遅膈内拒痛（一云頭痛即眩）胃中空虚客熱動膈短氣煩躁心内懊（於告反）憹（音農）陽氣内陷心下因堅則爲結胷大陷胷湯主之

若不結胷但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黄

大陷胷湯方

蜀大黄（六兩破）　甘遂末（一錢匕）　芒消（一升）

右三味以水六升先煑大黄取二升去滓内芒消煑一兩沸
内甘遂末温服一升得快利止後服千金翼同
又傷寒六七日結胷熱實脉沈緊心下痛按之石堅大陷胷湯
主之方依前法
又傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯
但結胷無大熱者此水結在胷脅也但頭微汗出者大陷胷湯
主之方依前法
大柴胡湯方
柴胡半斤 枳實四枚炙 生薑五兩 黄芩三兩
芍藥三兩 半夏半升洗 大棗十二枚擘
右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升温服
一升日三服一方加大黄二兩若不加大黄恐不名爲大柴
胡湯忌羊肉餳千金翼古今録驗同

又太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者本有久
寒也而反下之若利止者必作結胷未止者四日復下之此作
協熱利也
又太陽病下之其脉促不結胷者此爲欲解也若心下滿鞕痛
者此爲結胷也大陷胷湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不
中與之也宜半夏瀉心湯主之方
半夏半升洗 乾薑三兩 人參三兩 甘草三兩炙
黄連一兩 大棗十二枚擘 黄芩三兩
右七味切以水一斗煑取六升去滓温服一升日三若須大
陷胷湯服者如前法忌羊肉餳海藻菘菜豬肉冷水等千
金翼同一方半夏五兩
又小結胷病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胷湯主之方
黄連一兩上好者 栝樓實一枚大者破 半夏半升洗

右三味切以水六升煮栝樓實取三升去滓內諸藥煮取二升去滓溫分三服忌羊肉餳豬肉千金翼同

又病在太陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水而反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散用前篇方

又寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯方如前法白散亦可服

文蛤散方

文蛤五兩

右一味擣篩爲散以沸湯和一方寸匕服之湯用五合千金翼同

又白散方

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分去心及皮熬令黑赤別研如脂

右三味擣篩更於臼內擣之以白飲和服強人半錢匕羸人減之病在膈上則吐在膈下則利利不止飲冷粥一杯止並出第四卷中千金翼同忌豬肉蘆笋等

傷寒嘔噦方一十四首

病源傷寒病後胃氣不和此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥瀉下及飲冷水病折以後熱勢既退冷氣乃動故使心下堅牢噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也出第八卷中

仲景傷寒論療嘔噦心下悸痞鞕不能食小半夏湯方

半夏一升洗 生薑八兩去皮

右二味切以水七升煮取一升半去滓分再服忌羊肉餳

又療嘔噦心下痞鞕者以膈間有水頭眩悸半夏加茯苓湯方

半夏一升洗 生薑八兩去皮 茯苓三兩

右三味切以水七升煮取一升半去滓溫分再服忌羊肉餳酢等物

又療胷內似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹徹心中憒憒然無賴者生薑汁半夏湯兼主天行方

生薑汁一升　半夏半升洗切

右二味以水三升煎半夏取一升內薑汁取一升半緜漉小冷分二服一日一夜服令盡嘔噦一服得止者停後服忌羊肉餳救急同

又療乾嘔噦若手足厥冷者小橘皮湯兼主天行方

橘皮四兩　生薑八兩去皮

右二味狹長切以水七升煮取三升去滓小冷服一升下咽則愈救急同出第十六卷中

深師療傷寒病噦不止甘草湯方兼主天行

甘草三兩炙　橘皮三兩

右二味切以水五升煮取一升去滓頓服之日三四服取差

忌海藻菘菜雀氏同

又半夏散方

半夏洗焙乾

右一味末之生薑湯和服一錢匕忌羊肉餳等

又赤蘇湯方

赤蘇一把

右一味水三升煮取一升去滓稍稍飲之肘後同

又乾薑丸方

乾薑六分　附子四分炮

右二味擣篩以苦酒丸如梧子服三丸日三服酒飲下皆得

忌豬肉肘後同

又療傷寒噦甘竹茹湯方

甘竹茹四兩　生白米一升

右二味以水八升煮之取米熟湯成去滓分服徐徐服療
風熱氣嗽甚神驗諸嗽亦佳
又療傷寒嘔噦胃滿虛煩不安大橘皮湯方
橘皮一兩 甘草一兩炙 生薑四兩 人參二兩
右四味切以水六升煮取二升去滓分三服忌海藻菘菜並
出第十四卷中
小品茅根橘皮湯療春夏天行傷寒胃冷變啘方
白茅根切一升 橘皮三兩 桂心二兩切
右三味切以水六升煮取三升去滓溫分三服數數服之盡
復合之啘止乃停取微汗有熱減桂心一兩忌生葱文仲同
出第六卷中一方有葛根二兩
千金療傷寒後嘔噦及乾嘔不下食生蘆根飲方
生蘆根切一升 青竹茹一升 粳米三合 生薑二兩切
右四味以水七升先煮千里鞋底一隻取五升澄清下藥煮
取二升半去滓隨意便飲不差重作
又療傷寒後嘔噦通草湯方
通草三兩 生蘆根切一升 橘皮一兩 粳米三合
右四味切以水五升煮取二升去滓隨意便稍飲不差更作
取差止古今錄驗文仲同出第十卷中
千金翼乾嘔吐涎沫而頭痛茱萸湯主之方
吳茱萸一升炒 大棗十二枚擘 生薑六兩切 人參三兩細剉
右四味以水五升煮取二升去滓分服七合日三仲景同出
第十卷中此張仲景傷寒論方
傷寒咽喉痛方八首
病源傷寒病過經而不愈脉反沈遲手足厥逆者此為下部脉
不至陰陽隔絕邪客於足少陰之經毒氣上熏故喉咽不利或

痛而生瘡出第七卷中

仲景傷寒論少陰病咽喉痛者半夏散及湯主之方

半夏洗 甘草炙 桂心

右三味等分各擣篩畢更合擣之以白飲服方寸匕日三服若不能服散者水一升煮七沸內散兩匕更煮三沸下火令小冷少少含細嚥之半夏有毒不當散服之忌羊肉生葱海藻菘菜餳千金翼同出第六卷中

文仲療傷寒毒攻喉咽腫痛方兼主天行

切商陸炙令熱以布藉喉以熨布上冷復易之肘後同

又方

眞蔄茹爪甲大內口中以手小嚼汁以漬喉當微覺異爲佳亦主天行肘後同

又附子丸方

附子炮 藜蘆等分

右二味末之蜜和丸服如梧子一枚飲下含黃蘗亦佳並出第二卷中忌豬肉狸肉

深師貼喉膏療傷寒舌強喉痛方

蜜一升 甘草四兩切 豬膏半斤

右三味微火煎甘草豬膏令數沸去滓乃內蜜溫令銷相得如棗大含化稍稍咽之忌海藻菘菜出第十四卷中

集驗療傷寒熱病喉中痛閉塞不通烏扇膏方

生烏扇一斤切 豬脂一斤

右二味合煎烏扇藥成去滓取如半雞子薄綿裹之內口中稍稍咽之取差張文仲千金等同忌酒蒜等物

又升麻湯方

升麻三兩 通草四兩 射干二兩 羚羊角三兩屑

芍藥三兩　生蘆根切一升
右六味切以水七升煮取二升半去滓分爲三服徐徐服千金古今録驗同並出第三卷中
千金治傷寒熱病後口乾多唾咽痛乾棗丸方
乾棗二十枚　烏梅十枚
右二味擣合蜜和丸如杏核大綿裹含化嚥津自愈出第十卷中

傷寒吐唾血及下血方三首

病源此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五藏内有瘀積故吐血出第八卷中
仲景傷寒論吐血不止者柏葉湯主之方
青柏葉三兩　乾薑三兩切　艾三把
右三味以水五升煮取一升去滓別絞取新出馬通汁一升相和合煎取一升綿濾之温分再服馬通是馬屎汁也一方有阿膠無艾
又吐血下血黄土湯主之方
釜竈下黄焦土半升綿裹　甘草三兩炙　乾地黄三兩
白朮三兩　附子三兩炮破　阿膠三兩炙末　黄芩三兩
右七味切以水八升煮六味取二升去滓内膠令烊余章切下並同分三服忌海藻菘菜蕪荑豬肉桃李雀肉等物並出第十六卷中
古今録驗蒲黄湯療傷寒温病天行疫毒及酒客熱傷中吐血不止面黄乾嘔心煩方
蒲黄　桑寄生　桔梗一作栝樓　犀角屑
甘草各二兩炙　葛根三兩
右六味切以水七升煮取三升去滓分三服徐徐服之忌海藻菘菜豬肉出第三卷中

傷寒衄血方四首

病源傷寒病衄血者此由五藏熱結所爲也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻出血也肺主於氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄衄家不可攻其表汗出額上俎急而緊直視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脉浮緊發熱其身無汗自衄者愈出第八卷中

肘後療傷寒大病差後小勞便鼻衄牡蠣散及丸方

左顧牡蠣（十分熬）　石膏（五分）

右二味擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大酒服十五丸集驗千金並同出第二卷中

小品芍藥地黄湯療傷寒及溫病應發汗而不發之內瘀有畜血者及鼻衄（女六反）吐血不盡內餘瘀血面黄大便黑者此主消化瘀（於據反）血方

芍藥（三兩）　生地黄（半斤）　牡丹（二兩）　犀角（一兩屑）

右四味切以水九升煑取三升分三服其人喜忘如狂者加地黄三兩黄芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者爲無熱但依方服不須黄芩也忌蕪荑胡荽（一方不加地黄）

崔氏療傷寒衄鼻熱毒去血若去數升者勿療自住若爲去血不住者外以飛雪湯洗內以苦參湯療之飛雪洗之湯方兼療天行

麻黄（三兩去節）　石膏（三兩碎）　芫花（一兩熬）　大黄（二兩）

右四味切以水一斗半煑取七升去滓沈冷披髮仰卧因以湯淋其額趣令血住止勿向下卧及坐也湯中有芫花壞人眼勿近之

又療衄鼻苦參湯方

苦參三分 黃連二兩 梔子二七枚擘 大黃一兩

地黃一兩生乾者

右五味切以水五升煑取一升半去滓分再服吾其年已療數十人無不差者都下地黃難得遇無使便闕亦差忌蕪荑豬肉冷水並出第一卷中一方更用石榴花半兩

傷寒煩渴方九首

病源傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下已後腑藏空虛津液竭絶腎家有餘熱故渴也出第七第八卷中

仲景傷寒論療服桂枝湯大汗後煩渴熱不解脉洪大者屬白虎加人參湯方

知母六兩 甘草二兩炙 石膏一升碎綿裹 人參二兩

粳米一升玉函經用糯米

右五味切以水一斗二升煑米熟去米内諸藥煑取六升去滓温服一升日三忌海藻菘菜出第十卷中小品同

又若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方

豬苓一兩去皮 茯苓一兩 阿膠一兩炙 滑石一兩碎綿裹

澤瀉一兩

右五味以水四升先煑四物取二升去滓内阿膠令烊銷温服七合日三服忌醋物千金翼同出第五卷中

范汪栝樓湯主渴飲方

栝樓根内黃脉少者三兩

右一味切以水五升煑取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煑好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾後乃服栝樓湯其銀汁須冷服出第二十卷中

千金療傷寒後結熱在内煩渴青葙子丸方

青葙子五兩 龍膽三兩 黃芩一兩 梔子人一兩
苦參一兩 黃蘗二兩 栝樓一兩 黃連二兩
右八味擣篩爲末蜜丸先食服如梧子七丸飲下日三不知稍增忌豬肉冷水集驗同出第九卷中

深師黃芩人參湯療傷寒吐下後內外有熱煩渴不安方
黃芩 人參 甘草 桂心
生薑各二兩 大棗十五枚擘破
右六味切以水八升煮取三升分三服徐徐服忌菘菜海藻生葱等物

又療傷寒除熱止渴欲飲水栝樓根湯方
黃芩三兩 人參二兩 桂心二兩 大黃二兩
栝樓根三兩 芒消二兩 甘草二兩炙
右七味切以水八升煮取三升去滓飲一升須臾當下不下復飲一升得下止勿復飲湯藥力勢歇乃可食糜耳一方用生薑二兩忌海藻菘菜生葱油膩等物

又療傷寒下後除熱止渴五味麥門冬湯方
麥門冬去心 五味子 人參 甘草炙
石膏碎各一兩
右五味擣篩三指撮水一升二合煮令沸得四合盡服忌海藻菘菜並出第十四卷中

古今錄驗黃龍湯療傷寒十餘日不解往來寒熱狀如溫瘧渴胸滿心腹痛方
半夏半升洗 生薑三兩 人參三兩 柴胡半斤
黃芩三兩 甘草三兩炙 大棗十二枚擘
右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服不嘔而渴去半夏加栝樓根四兩服如前忌羊

肉餳海藻菘菜等物出第三卷中（此本張仲景傷寒論方）

又高堂丸療傷寒苦渴煩滿欲死令極飲水法方

大黃（二分） 消石（三分熬） 釜底墨（一分） 竈突中墨（一分）

黃芩（一分） 梁上塵（一分） 竈中黃土（一分） 麻黃（二分去節）

胡洽用芒消無黃土

右八味篩末蜜和如彈丸大取一丸著一盞水中盡用服之則自極飲水汗出得熱除矣一名黑奴丸一名駐車丸并療温瘧神良並出第二卷中（此方第一卷用小麥黑奴名黑奴丸）

傷寒癖實及宿食不消方二首

病源此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃中有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消也出第八卷中

深師駃豉丸療傷寒留飲宿食不消一名續命丸方

黃芩（五兩） 大黃（五兩） 梔子人（一十六枚大） 黃連（五兩去毛）

豉（一升熬） 甘遂（三兩太山者） 麻黃（五兩去節） 芒消（二兩）

巴豆（一百枚去皮及心熬研）

右九味擣篩白蜜和丸如梧子服三丸以吐下爲度若不吐利加二丸一本有杏人七十枚范汪同忌豬肉冷水蘆笋等出第十四卷中

古今錄驗續命丸療傷寒及癖實痰癊百病方

大黃（五兩） 黃連（一兩） 麻黃（五兩去節） 甘遂（三兩熬）

黃芩（二兩） 芒消（二兩研） 杏人（七十枚去皮尖熬） 巴豆（一百枚去心熬研）

豉（一升熬）

右九味擣篩蜜和丸得傷寒一日服一丸如小梧子大二日二丸至六七日六七丸但吐下得汗愈若水澼及痰實服三五丸日二范汪延年刪繁同忌豬肉冷水蘆笋出第三卷中

傷寒春冬欬嗽方三首

病源此由邪熱客於肺也上膲有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽出第八卷中

小品射干湯主春冬傷寒秋夏中冷欬嗽曲拘不得氣息喉鳴啞失聲乾嗽無唾喉中如哽者方

射干（二兩） 半夏（五兩洗） 杏人（二兩去皮尖兩人） 乾薑（二兩炮）
甘草（二兩炙） 紫菀（二兩） 肉桂（二兩） 吴茱萸（二兩）
當歸（二兩） 橘皮（二兩） 麻黄（二兩去節） 獨活（二兩）

右十二味切以水一斗煮取三升去滓溫分三服始病一二日者可服此湯汗後重服勿汗也病久者初服可用大黄二兩初秋夏月暴雨冷及天行暴寒熱喜伏於內宜生薑四兩代乾薑除茱萸用枳實二兩炙忌羊肉海藻菘菜餳生葱出第六卷中

古今録驗下氣橘皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

橘皮 紫菀 麻黄（去節） 杏人（去雙人尖皮）
當歸 桂枝 甘草（炙） 黄芩（各三分）

右八味切以水七升煮取三升分三服不差重合之忌海藻菘菜生葱出第三卷中

延年療傷寒骨節疼頭痛眼睛疼欬嗽知母湯方

知母（二兩） 貝母（三兩） 乾葛（三兩） 芍藥（三兩）
石膏（四兩碎裹） 黄芩（三兩） 杏人（一兩去皮尖及雙人） 梔子人（三兩擘）

右八味切以水七升煮取二升五合去滓分爲三服如人行八九里再服忌蒜麪七日出第九卷中

傷寒攻目生瘡兼赤白瞖方六首

病源目者藏腑之精華肝之外候也傷寒熱毒壅滯熏蒸於肝

上攻於目則令目赤腫痛若毒氣盛者眼生瞖膜又肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生瘡瞖白膜息肉出第八卷中

肘後療傷寒大病後熱毒攻目方

煑蜂房以洗之日六七度張文仲同

又方

冷水漬青布以掩目張文仲同

又療熱病後生瞖方

燒豉二七粒末內管中以吹之文仲備急同並出第二卷中

小品漏蘆連翹湯療傷寒熱毒變作赤色癰疽丹瘮腫毒及眼赤痛生彰瞖悉主之方兼療天行

漏蘆二兩　連翹二兩　黃芩二兩　麻黃二兩去節

白歛三兩　升麻二兩　甘草二兩炙　大黃三兩切

枳實三兩炙

右九味切以水九升煑取三升去滓溫分三服相去二食頃更服熱盛者可加芒消二兩忌海藻菘菜等物千金同

又秦皮湯療毒病衝眼忽生赤瞖或白或腫膚起或赤痛不得視光痛入心肝或眼外浮腫如吹汁出生膜覆珠子方

秦皮二兩　前胡二兩　常山二兩　黃芩二兩

升麻二兩　芍藥二兩　白薇二兩　枳實二兩炙

大黃三兩　甘草二兩炙

右十味以水八升煑取三升分三服相去二食頃更服若盛熱者可加芒消二兩忌海藻菘菜生葱生菜出第六卷中一方加蕤人一兩梔子人半兩

張文仲秦皮湯主傷寒病熱毒氣入眼生赤脉赤膜白膚白瞖

者及赤痛不得見光痛毒煩惱者神効方

秦皮　升麻　黃連各一兩

右三味切以水洗去塵用水四升煮取二升半冷之分用三合仰眼以綿繞筯頭取湯以滴眼中如屋漏狀盡三合止須臾復用日五六遍乃佳忌豬肉冷水出第二卷中

傷寒口瘡方二首

病源夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其熱毒在藏心脾煩壅表裏俱熱熱不已毒氣熏於上膲故令口舌乾燥生瘡也出第七卷中

深師療傷寒熱病口瘡黃蘗蜜方

黃蘗削去上皮取裏好處薄斜削

右一味以崖蜜半斤極消者以漬蘗一宿唯欲令濃含其汁良久吐之更復如前若胷中熱有瘡時飲三五合尤良

國立故宮博物院 NATIONAL PALACE MUSEUM

又療傷寒口瘡爛者升麻湯方

升麻一兩　甘草一兩炙　竹葉五合切　麥門冬三分去心

牡丹一分　乾棗二十枚擘

右六味切以水四升煮取一升半去滓分五服含稍稍咽之爲度忌海藻菘菜胡荽等並出第十四卷中

傷寒手足欲脫疼痛方七首

病源此由熱毒氣從內而出循經絡攻於手足也人五藏六腑井滎俞皆出於手足指故毒從藏腑而出也出第八卷中

范汪療傷寒熱病手足腫欲脫方

生牛肉裹之腫消痛止深師同出第三十卷中

崔氏療傷寒手足熱疼欲脫方

取羊屎煮汁以淋之差止亦療時疾陰囊及莖腫亦可煮黃蘗洗之肘後深師集驗千金備急並同出第

一卷中

集驗療毒熱攻手足腫疼欲脫方

濃煮虎杖根適寒溫以漬手足入至踝上一尺范汪肘後千金同兼療天行

又方

酒煮苦參以漬之范汪千金集驗同並出第二卷

千金療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

煮馬糞若羊糞汁漬之豬膏和羊糞塗之亦佳范汪集驗肘後同

又方

取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳范汪集驗肘後同出第十卷中

備急療熱病手足腫欲脫者方兼主天行

以稻穰灰汁漬之佳集驗千金肘後同出第一卷中

傷寒虛羸方四首

病源其人血氣先虛復為虛邪所中發汗吐下之後經絡俱損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉出第八卷中

集驗療傷寒虛羸少氣氣逆若嘔吐方

石膏一升碎綿裹　竹葉二把　麥門冬一升去心　人參二兩

半夏一升洗　生薑四兩　甘草二兩炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓內粳米一升米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳出第三卷中

又生地黃湯療傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃三斤　大黃四兩　大棗二十枚擘　甘草一兩炙

芒消二合

右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服忌海藻菘菜出第二卷中

千金療傷寒虛羸少氣嘔吐竹葉石膏湯方

石膏（一升碎綿裹） 竹葉（二把） 麥門冬（一升去心） 人參（二兩）

半夏（半升洗） 甘草（二兩）

右六味以水一斗煑取六升去滓內粳米一升煑米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳出第十卷中（此張仲景傷寒論方）

張文仲雞子豉湯療吐下後虛羸欲死方

雞子（十一枚） 豉（四合綿裹）

右二味以水五升先煑雞子取二升內豉又煑三四沸去滓分再服文同此出姚方第二卷中集驗備急同各用雞子十四枚

傷寒不得眠方四首

病源夫衞氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽幷所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也出第八卷中

仲景傷寒論療傷寒發汗若吐下後虛煩不得安眠劇則反覆顛倒心內苦痛懊憹（上奥下農又奴凍反）者屬梔子豉湯證方

肥梔子（十四枚擘） 香豉（四合綿裹）

右二物以水四升先煑梔子取二升半去滓內豉更煑取一升半去豉分溫再服得吐止後服

肘後療大病差後虛煩不得眠眼中疼痛懊憹烏梅豉湯方

豉（七合綿裹） 烏梅（十四枚擘）

右二物以水四升煑烏梅取二升半內豉更煑取一升半去滓溫分再服無烏梅用梔子四枚

又半夏茯苓湯方

半夏三兩洗　秫米一升　茯苓四兩

右三味切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煮諸藥得五升去滓溫分五服忌羊肉餳酢物等並出第一卷中

深師酸棗湯療傷寒及吐下後心煩乏氣晝夜不眠方

酸棗人四升　麥門冬一升去心　甘草二兩炙　蝭母二兩知母也

茯苓二兩　芎藭二兩　乾薑三兩

右七味切以水一斗六升煮酸棗取一斗去棗內藥煮取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜大醋出第十四卷中

傷寒小便不利方九首

病源傷寒發汗後而汗出不止津液少胃中極乾小腸有伏熱故小便不通也出第八卷中

仲景傷寒論少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣或欬或小便自利或下利或嘔者眞武湯主之方

茯苓三兩　白芍藥三兩　附子一枚炮去皮破八片　白术三兩

生薑三兩去皮

右五味切以水八升煮取三升去滓溫服七合日三若欬者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便自利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩嘔者去附子加生薑足前成半斤忌酢豬肉桃李雀肉等出第六卷中深師同兼主天行大効

又傷寒六七日已發汗而復下之胷脅滿結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此未解也屬小柴胡桂薑湯主之方

柴胡半斤去土　桂心三兩　黃芩三兩　牡蠣二兩熬

甘草二兩炙　栝樓根四兩　乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三初一服微煩後汗出便愈忌生葱海藻菘菜出第四卷中

又療傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯湯主之方

茵蔯六兩　肥梔子十四枚擘　大黃二兩去皮酒洗破三片

右三味以水一斗二升先煑茵蔯減二升去滓內二物煑取三升去滓分溫三服日三小便當利尿如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去出第五卷中張文仲千金並同

又服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

芍藥　生薑切　白朮　茯苓各三兩

甘草二兩炙　大棗十二箇擘

右六味切以水八升煑取三升去滓溫服一升小便利則愈

忌海藻菘菜酢桃李雀肉等

肘後療小腹滿不得小便方兼療天行

細末雄黃蜜和爲丸如棗核內溺孔中令入半寸出第二卷中文仲同

千金翼療少陰病四逆其人或欬或悸其悸反或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散方

甘草十分炙　枳實十分炙　柴胡十分　芍藥十分

右四味擣細篩白飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑各五分并主下利肖中悸者加桂心五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚洩利下重者先以水五升煑薤二升取三升以散三方寸匕內湯中煑之取一升半分再服忌海藻菘菜仲景范汪同出第十卷中

崔氏療傷寒熱盛小便不利滑石湯方兼療天行

滑石二兩　葶藶子一合熬

右二物以水二升煑取七合去滓頓服之

又方

搗生葱傅臍下横文中燥易之

又瞿麥湯方

瞿麥三兩 甘草三兩炙 滑石四兩 葵子二合半

石韋三兩去毛令盡

右五味切以水八升煑取二升半分三服忌海藻菘菜並出第一卷中古今録驗同

傷寒下痢及膿血黄赤方一十六首

病源傷寒病若表實裏虚熱氣乘虚而入攻於腸胃則下黄赤汁若温毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦或如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清穀下清穀者不可攻表汗出必脹滿表裏俱虚故也

傷寒六七日不利便發熱而痢其人汗出不止者死但有陰無陽故也

噦

下痢有微熱其人渴脉弱者令自愈脉沈弦者下重其脉大者爲未止脉微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血下痢脉反浮數尺中自濇其人必圊膿血少陰病下利若痢自止惡寒而欲踡手足温者可療

陽明病下痢其人脉浮大此皆爲虚弱強下之故也

傷寒下痢日十餘行其人脉反實者死出第八卷中張仲景傷寒論陽明無下痢證不可下或有云下利其脉浮大者此皆爲虚以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴當温之與水即噦

仲景傷寒論傷寒本自寒下醫復吐之下之不解者寒格更遂吐下食入還吐出者屬乾薑黄連人參湯主之方

乾薑 黄連 黄芩 人參各三兩

右四味切以水六升煑取二升去滓分再服之忌豬肉冷水等出第六卷中

又太陽病桂枝證醫反下之痢遂不止脉促（一作縱）者表未解也喘而汗出者屬葛根黄連湯方

葛根（八兩） 黄連（三兩金色者） 黄芩（三兩切） 甘草（二兩）

右四味切以水八升先煑葛根減二升掠去沫內諸藥煑取二升去滓温分再服忌豬肉冷水海藻菘菜出第七卷中

肘後療傷寒若下膿血者赤石脂湯方

赤石脂（二兩碎） 乾薑（二兩切） 附子（一兩炮破）

右三味以水五升煑取三升去滓温分三服後臍下痛者加當歸一兩芍藥二兩用水六升煑忌豬肉范汪張文仲同

又主下痢不能食者兼療天行黄連丸方

黄連（一兩） 烏梅（二十枚炙燥）

右二味擣末臘如博碁子一枚蜜一升於微火煎令可丸如梧子一服十五丸日三忌豬肉冷水出第一卷中

又白通湯療傷寒泄痢不已口渴不得下食虚而煩方

大附子（一枚生削去黒皮破八片） 乾薑（半兩炮） 甘草（半兩炙）

葱白（十四莖）

右四味切以水三升煑取一升二合去滓温分再服渴微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良忌海藻菘菜豬肉范汪同出第十四卷中（張仲景傷寒論白通湯惟主少陰下利厥逆無脉乾嘔而煩者白通加豬膽湯主之本無甘草仍不加犀角）

范汪療傷寒腹中微痛不止下痢秦皮湯方

秦皮（三兩） 黄連（四兩） 白頭翁（二兩） 阿膠（三兩）

右四味㕮咀三味以水八升煑得二升絞去滓內膠令烊適寒温先食飲七合日三服忌猪肉冷水

又豉薤湯療傷寒暴下及滯痢腹痛方

豉（一升） 薤白（一把寸切）

右二物以水三升煑令薤熟漉去滓分為再服不差復作

令

又蕙草湯療傷寒除熱止下痢方

蕙草二兩 黃連四兩 當歸二兩

右三味切以水六升煮得二升適寒溫飲五合日三忌猪肉冷水等物

又療傷寒下痢脉微足厥冷通草湯方

通草一兩 乾薑一兩 枳實四兩炙 人參一兩

附子一枚炮令裂破

右五味切以水六升煮取二升適寒溫飲五合日三不差稍加至七合忌豬肉並出第三十卷中

小品犀角湯療熱毒下黃赤汁及赤如腐爛血及赤滯如魚腦腹痛壯熱諸藥無效方

黃蘗一兩半 黃芩一兩半 白頭翁一兩 黃連二兩

當歸一兩 牡蠣一兩半熬 犀角屑半兩 艾葉半兩

冉　減

石榴皮一兩半 桑寄生一兩 甘草一兩炙

右十一味切以水八升煮取三升分三服忌豬肉冷水海藻菘菜出第六卷中古今錄驗同

集驗療傷寒後下痢膿血蘗皮湯方

黃蘗二兩 黃連四兩 梔子十四枚擘 阿膠一兩炙

右四味切以水六升煮三味取二升去滓內膠令烊溫分再服忌豬肉冷水范汪同出第二卷中

千金翼熱痢下重白頭翁湯主之方

白頭翁二兩 黃蘗三兩 黃連二兩 秦皮三兩切

右四味切以水七升煮取二升去滓分服一升不愈更服忌豬肉冷水范汪同出第十卷中此張仲景傷寒論方

崔氏療傷寒後赤白滯下無數阮氏桃華湯方

赤石脂八兩冷多白滯者減四兩 粳米一升 乾薑四兩冷多白帶者加四兩切

右三味以水一斗煑米熟湯成去滓服一升不差復作熱多則帶赤冷多則帶白千金翼方不同加減稍別傷寒論千金范汪同張仲景傷寒論煑湯和赤石脂末一方寸匕服

又療傷寒熱痢黃連丸方

黃連三兩去毛　當歸三兩　乾薑二兩　赤石脂二兩切

右四味擣篩蜜和丸如梧子大服三十丸日三叔尚書以療熱痢是歳傳與東都當方諸軍營及夏口戍人發者數千餘人余時亦復用之亦佳但時用之不及諸湯速耳當服百丸許乃斷忌豬肉冷水並出第一卷中

張文仲陶氏傷寒下痢豉薤湯方

豉一斤綿裹　薤白一握　梔子十四枚擘破

右三味以水五升煑取二升半去滓温分三服小品去此方主温毒及傷寒内虚外熱攻腸胃下黃赤汁及如爛肉汁并去赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之水四升先煑梔子薤白令熟内豉煑取二升分三服千金備急方同

又療傷寒下痢惡血不止犀角湯方

乾薑一兩　犀角一兩末　地榆一兩　蜜二合

右四味切以水五升煑取一升半去滓下蜜更煑至一升分三服自愈此治熱毒蠱利出千金同並出第十五卷中

傷寒䘌瘡方一十首

病源凡得傷寒及天行熱病日數校多腹内有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五藏及下部也䘌病之候齒齗無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沈重忽忽喜眠如此皆爲蟲食其肛肛爛見五藏則死當數看其上脣内有瘡唾血脣内如粟瘡者則心内懊憹痛此蟲在上食其五藏下脣内生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人也出第八卷中

肘後若病人齒齗無色舌上白者或喜眠憒憒(音膾)不知痛痒處或下痢宜急療下部不曉此者但攻其上不以爲意下部生瘡蟲食其肛肛爛見五藏便死也療之方

燒馬蹄作灰細末豬膏和塗綿以導下部日數度差

又桃人苦酒湯方

桃人(五十枚去皮尖及兩人)　苦酒(二升)　鹽(一合)

右三味煑取六合去滓盡服之並出第一卷中

深師療䘌食下部桃皮湯方

桃皮(二兩)　槐子(二兩)　艾(二兩)　大棗(三十枚擘一方用黃連)

右四味切以水五升煑取三升去滓溫分三服之

又療䘌蟲食下部方

以泥作甖以竹筒如指所攢穿甖肚筒一頭內下孔中內如雞子艾燒之人就甖口吹之常令艾燒強人可益艾甚良千金同

又龍骨湯治傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人宜服此湯除熱毒止痢神方

龍骨(半斤碎)

右一味以水一斗煑取四升沈之井底令冷服五合餘漸漸進之恣意如飲尤宜老少無味殆如飲水赤斷下文仲備急千金等同

又療傷寒及諸病之後內有瘡出下部煩者黃連犀角湯方

黃連(一兩去毛)　烏梅(十四枚擘)　犀角(三兩屑)　青木香(半兩)

右四味切以水五升煑取一升半分再服忌猪肉冷水等並出第十四卷中

范汪療傷寒心中懊憹下痢穀道中爛傷當服懊憹散以䘌蟲藥

內𣪍道中懊憹散方

藋蘆十分　乾漆二分　蕳茹二分

右三味各異擣篩粉粥飲服一錢匕先食日再服千金同

又療𧏾懊憹麝香散方

麝香一分研　雄黃一分研　丹砂一分研　犀角一分屑

羚羊角一分屑　青葙子一分　黃連一分　升麻一分

桃人一分熬　貝齒一分

右十味並擣合下篩先食以小麥粥服錢五匕服藥訖復以錢五匕綿裹以導𣪍道中食頃去之日三忌豬肉冷水生血物等並出第三十三卷中

小品青葙子散療熱病有𧏾下部生瘡方

青葙一兩　藋蘆四兩　狼牙三分　橘皮二分

蕳茹二分切之

右五味擣下篩粥飲和合服兩錢匕日三不知稍增之出第六卷中千金同有甘草一分

張文仲療傷寒兼𧏾瘡王叔和云其候口脣皆生瘡唾血上脣內有瘡如粟者則心中懊憹痛如此則此蟲在上乃食五藏若下脣內生瘡其人喜眠者此蟲在下食下部方

取雞子一枚扣頭出白與漆一合熟和令調如漆還內殼中仰吞之食頃或半日或下蟲或吐蟲劇者再服乃盡熱除病愈凡得熱病腹內熱食少三蟲行作求食食人五藏及下部人不能知可服此藥不爾𧏾蟲殺人集驗深師肘後同

又方

豬膽一具

右一味漬著半升苦酒中和之煎三沸三下三上藥成可放溫空腹飲一滿口蟲即死有人經用之驗並出第二卷中千

金同

傷寒陰陽易方八首

病源傷寒陰陽易病者是男子婦人傷寒病新差未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新差未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體重小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不能舉眼内生䁾四肢拘急小腹疞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不能舉百節解離經脉緩弱血氣虛骨髓枯竭便噓噓吸吸氣力轉少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死出第八卷中

深師療婦人得溫病雖差平復未滿一百日不可與交合交合爲陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以易婦人名爲陽易速當療之可差滿四日不可療也宜令服此藥方

乾薑四兩

右一味擣末湯和一頓服溫覆汗出得解止手足伸遂愈范汪同出第十四卷中

范汪豭音加雄鼠也下同鼠糞湯療傷寒病後男子陰易方

薤一大把　豭鼠糞十四枚

右二味以水五升煮取二升盡飲之溫臥汗出便愈亦理勞復豭鼠屎兩頭尖者是也肘後薤作藍

又丹米湯療傷寒病已後男子陰易方

丹米

右一味末以薄酒和盡飲之溫覆汗出便愈亦隨人大小不必三兩自以意消息之

又療交接勞復卵腫腹中絞痛便絶死竹皮湯方

刮青竹皮一升

右一味以水三升煑五六沸絞去滓頓服立愈肘後同

又療陰陽易栝樓湯方

栝樓根二兩

右一味以水五升煑取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煑好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾乃服湯小便利即差栝樓湯銀汁須冷服與前療渴方同

千金曰昔者有人得傷寒病已差未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虚未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病口舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋王者病愈後六十日已能行射獵以房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒差以十餘日能乘馬行來謂平復以房室則小腹急痛手足拘拳而死醫者張苗說有婢得病後數十日有六人姧之皆死婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人療之燒裩散方兼主溫病陰易也

取女人中裩近隱處燒取灰

右一物爲散服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此爲愈矣女人病可取男子裩如前法酒水服此本仲景方肘後同

又療交接勞復卵腫縮腹中絞痛便欲死者方

取交接婦人衣服以覆男子肘後同

又方

取女人手足爪二十枚　女人中衣裳一尺燒

右二味末以酒服亦米汁飲服之出第十卷中肘後同

傷寒勞復食復方二十五首

病源傷寒病新差津液未復血氣尚虛若勞動早更復成病故云復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脉沈緊者宜下之又食復傷寒病新差及大病之後脾胃尚虛穀氣未復若食豬肉腸血肥魚及久膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌粢黍飴餔炙膾棗栗諸果牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不可不慎護也夫病新差後但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁慎不可食豬狗等肉並出第八卷中

廣濟療傷寒因食勞復頭痛壯熱梔子湯方

梔子十四枚擘　香豉一升綿裹　葱白一握切　粟米三合

雄鼠屎兩頭尖者二七枚燒令煙絕末

右五味以水八升煮取二升三合去滓內鼠屎分三服服別相去如人行六七里須利內芒消五分忌麪炙肉蒜等物出第一卷中

深師療勞復大青湯方

大青四兩　甘草二兩炙　阿膠二兩炙　香豉二兩

右四味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日五六欲盡復作常使有湯渴便飲無毒除熱止吐下傷寒一二日上至十數日困篤發汗熱不解吐下後熱不除止下痢甚良先煮大青甘草取四升去滓內膠豉膠消盡便漉去勿令豉壞當預漬膠令釋也忌菘菜海藻集驗肘後千金同

又方

取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之

溫卧取汗愈雞子殼悉服之肘後崔氏同

又方

取馬糞燒擣爲散冷酒服方寸匕良三炊頃便驗神良

又療傷寒差後勞復葵子湯方

葵子二升 粱米一升

右二味合煮作薄粥飲之多多爲佳取汗立差並出第十四卷中

范汪療傷寒病差語言書疏坐起行步勞復方

創青竹皮多多煮之令厚濃服三升汁則愈

又傷寒已愈食飲多勞復大黃豉湯方

豉五合 甘草二兩炙 桂心二兩 大黃四兩

芒消半斤

右五味㕮咀以水六升煮得二升去滓先食適寒溫飲一升日再忌海藻菘菜生葱等物

又療傷寒差已後飲食勞復梔子湯方

梔子十四枚 豉一升 桂心二兩 麻黃二兩

大黃二兩

右五味㕮咀以水七升先煮麻黃掠去沫內餘藥更煮取二升去滓溫服一升日再服當小汗及下利忌生葱並出第三十四卷中

千金療傷寒溫病後勞復或食飲或動作梔子石膏湯方

梔子人三七枚擘 石膏五兩碎 鼠屎二十枚尖頭者 香豉一升綿裹

右四味以水七升煮取三升分三服

又療勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲之一合即愈

又方

取頭垢如棗核大吞一枚

又方

取飯燒爲末飲進一升肘後同

又療大病已差勞復者枳實梔子湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘

右二味以酢漿一斗先煎取六升煑藥取三升內豉一升煎五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者內大黃如碁子一枚范汪救急集驗並同出第十卷中張仲景傷寒論內大黃如博碁子五六枚

又療勞復垂死者方

煖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服則愈男兒亦得起死人方

又療食勞方

麴一餅煑取汁服之

又療食勞方

杏人五十枚酢二升煎取一升服之取汗則差

又方

燒人糞灰水服之方寸匕

又療傷寒差後更頭痛壯熱煩悶者方

服黃龍湯三合日三服

又欲令病人不復者方

燒頭垢如梧子大服之並出第十卷中

崔氏療傷寒勞復鼠矢湯方

梔子二七枚擘 豉五合 鼠屎兩頭尖者二七枚

右三味以漿水二升煑取一升去滓頓服數試異驗出第一卷中

古今錄驗梔子湯療傷寒勞復方

梔子十四枚擘 麻黃二兩去節 大黃二兩 豉一升綿裹

右四味切以水七升煮取二升分爲三服深師肘後同

又療傷寒勞復鼠屎湯方

鼠屎(二十一枚) 豉(一升綿裹) 梔子(七枚擘) 大黃(三兩切)

右四味以水五升煎取二升七合分三服微取汗應小鴨溏下千金同

又療病新差早起及食多勞復鼠矢豉湯方

鼠屎(兩頭尖者二十一枚) 香豉(一升)

右二味以水三升煮取一升盡服之温卧令小汗千金同

又療食不消勞復脉實者鼠矢梔子豉湯方

豉(二升綿裹) 鼠屎(二十一枚) 梔子(七枚擘) 麻黃(三兩去節)

右四味以水五升煮取二升分服七合汗微出日三服(千金麻黃作大黃)

又療傷寒已愈食飲多復發者方

豉(五合綿裹) 甘草(二兩炙) 大黃(四兩) 芒消(半兩)

右四味切以水九升煮取三升去滓飲一升日再范汪同忌菘菜海藻等

又療傷寒差令不復白芷散方

白芷(十二分) 白术(十分) 防風(八分) 栝樓(五分)

桔梗(四分) 細辛(三分) 附子(二分炮去皮) 乾薑(二分)

桂心(二分)

右九味擣篩爲散以粳米粥清服一錢匕食已服二錢小兒服一錢常以雞子作羹臛粳米飯多少與病人食之亦未必常雞子羹粳米飯如服藥訖即扶起令行步仍櫛頭洗手面食輒服之勞行如前則不復浩云數用佳范汪同忌豬肉桃李雀肉胡荽蒜青魚鮓生葱生菜出第三卷中(一方有人參三分)

傷寒百合病方七首

病源傷寒百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒

虛勞大病之後不平復變成斯病也其狀意欲食復不能食常默默欲得卧復不得卧欲出行而復不能行飲食或有美時或有不用時聞飲食臭或如強健人而欲卧復不得眠如有寒復如無寒如有熱復如無熱至朝口苦小便赤黄百合之病諸藥不能療得藥則劇而吐利如有神靈所加也身形如和其人脉微數毎尿輒頭痛其病六十日乃愈若尿時頭不痛淅淅然如寒者四十日愈若尿時快然但眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見其狀惡寒而嘔者病在上膲也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便硬三四日一大便時復小溏者病在中膲也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各隨其證以療之耳出第八巻中

仲景傷寒論療百合之病諸藥不能療若得藥則劇而吐痢如有神靈所加也身體仍和脉微數毎尿時輒頭痛六十日乃愈尿頭不痛淅淅然者四十日愈尿快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見者悉療之

又發汗已更發者百合知母湯主之方

百合七枚擘　知母三兩

右二味以泉水洗先漬百合經一宿上當白沫寫却其汁更以好泉水二升煮取一升去滓置之一處別以泉水二升煮知母取一升去滓二味汁相和煑取一升半分温再服之小品千金同

又下之已更發者百合滑石代赭湯主之方

百合七枚擘以泉水漬一宿上當白沫出去之　滑石三兩碎　代赭如彈丸一枚碎

右三味先以泉水二升煑百合取一升去滓置一廂又以泉水二

七

升煑和二味取一升去滓合煎取一升半分再服千金小品同

又吐之已更發者百合雞子湯主之方

百合七枚

右一味依前法泉水二升煑取一升去滓扣雞子一枚取中黃内百合湯中攪令調温再服之千金同

又不吐不下不發汗病形如初百合生地黃湯主之方

百合七枚

右一味依前法漬以泉水二升煑取一升生地黃汁一升二味汁相和煑取一升半温分再服一服中病者更勿服也大便當出惡沫千金小品並同

又百合病一月不解變成渴者

以漬百合水洗身法其後千金方中一味是後服栝樓牡蠣散其次則是並出第十七卷中

小品凡百合病見於陰而以陽法攻之其陰不得解也復發其汗此爲逆其病難治見於陽而以陰法攻之其陽不得解也復下之其病不愈千金百合病經一月不解變成渴者方

百合根一升切

右一味以水一斗漬之一宿以汁洗病人身也洗身訖食白湯餅今䏝飥也勿與鹽豉也渴不差可用栝樓根并牡蠣等分爲散飲服方寸匕日三服小品張仲景方同

又療百合病變而發熱者方

滑石三兩　百合根一兩炙

右二味末飲下方寸匕日三微利者止勿服之熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

又百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令色黃末飲服之方寸匕日

三滿消痛止小品同並出第十卷中

傷寒狐惑病方四首

仲景傷寒論狐惑之病其氣如傷寒嘿嘿但欲卧目瞑不得眠起則不安蝕於喉咽者爲惑蝕於陰者爲狐狐惑之病並惡飲食不欲聞飲食臭其面乍赤乍黒乍白蝕於上部其聲嗄蝕於下部其咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於下部苦參湯淹洗之蝕於肛外者雄黄熏之

又瀉心湯兼下利不止心中愊愊堅而嘔腸中鳴者方

半夏半升洗　黄芩三兩　人參三兩　乾薑三兩

黄連一兩　甘草四兩炙　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗煑取六升分服一升日三服忌豬肉冷水菘菜海藻羊肉餳千金同出第六卷中

又雄黄熏法兼主䘌病

雄黄一物研末以兩筒瓦合之燒以熏下部

千金療狐惑薰草黄連湯方

黄連四兩去皮　薰草四兩

右二味切以白漿一斗漬之一宿煑取二升去滓分爲二服小品同忌豬肉冷水

又其人脉數無熱微煩嘿嘿但欲卧汗出得之三四日眼赤如鳩眼者得之七八日其四眥黄黒能食者膿已成也療之方

以赤小豆三升漬之令生芽足復乾之加當歸三兩末漿水服方寸匕日三小品同出第十卷中此本仲景方

凡病形不可灸因火爲邪散走血脉傷脉尚可傷藏則劇井輸穴腫黄汁自出經絡外爛肉腐爲癰膿此爲火疽七居反醫所傷也凡微數之脉愼不可灸因火爲邪即致煩逆追虚逐實血散脉中火氣雖微内攻有力焦骨傷筋血難復也

外臺秘要方卷第二

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM